

[Cat. No.] **K-2921**

개요

AccuPower® SHIVD PCR Kit 는 새우에서 발병되는 십각류무지개바이러스병(SHIVD, Shrimp Hemocyte Iridescent Virus Disease)를 검출할 수 있는 Nested PCR 제품입니다. SHIVD 는 Infection with Decapod iridescent virus 1 (DIV1)으로도 불리며 새우에 치명적인 바이러스성 질병입니다. 새우가 SHIVD 에 감염되면 몸 색깔이 붉게 변화하거나 머리부분이 하얗게 되고 껍질이 약해지면서 가라앉아 죽는 증상을 보이며 폐사율이 80%까지 도달해 양식업자들에게 생산적 경제적으로 큰 피해를 일으키고 있습니다. 새우의 SHIVD 감염 확산에 대한 진단 및 확인을 위해 지속적인 모니터링을 하는 것이 중요합니다. 본 제품은 SHIVD 에 특이적인 PCR 에 필요한 모든 요소(DNA Polymerase, Primers, dNTPs, Reaction buffer)가 PCR 튜브에 건조되어 있어, 사용자는 주형 DNA 와 3 차 증류수만 첨가하면 손쉽게 PCR 반응용액을 준비할 수 있습니다.

특장점

- Nested PCR: 본 제품은 SHIVD 1st PCR Kit, SHIVD 2nd PCR Kit 로 구성된 Nested PCR 을 통해 SHIVD 를 검출할 수 있습니다.
- 편리성: Primer 를 포함한 PCR 반응에 필요한 모든 물질을 각 PCR tube 에 1회 반응씩 건조시킨 PreMix type 으로 편리하고 재현성 높은 PCR 반응을 수행할 수 있습니다.
- 높은 특이성 및 민감도: 비특이적 반응을 최소화하고 반응 효율을 극대화하는 *PyroHotStart* (Enzyme-mediated HotStart) 특허 기술을 적용하여 미량의 주형 DNA 에서도 target 유전자만을 효과적으로 증폭할 수 있습니다.
- 안정성: PCR 반응 혼합액에 안정화제가 포함되어 있어, solution type 제품보다 안정성이 뛰어납니다.

제품 조성

제품 조성	20 µl 반응	
	1 st PCR	2 nd PCR
Top DNA Polymerase	1 U	1 U
dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)	각 250 µM	각 250 µM
Reaction buffer with 1.5 mM MgCl ₂	1X	1X
Stabilizer and tracking dye	O	O
SHIV F1 Forward primer	1 µM	X
SHIV R1 Reverse primer	1 µM	X
SHIV F2 Forward primer	X	1 µM
SHIV R2 Reverse primer	X	1 µM

* Note: 본 키트는 연구용 제품이며, 진단용으로 사용할 수 없습니다.

제품 사양

Top DNA Polymerase	
5'→3' exonuclease activity	No
3'→5' exonuclease activity	No
3'-A overhang	Yes
1 st Fragment size	457 bp
2 nd Fragment size	129 bp

보관법

AccuPower® SHIVD PCR Kit 는 -20°C에서 보관해야 하며, 표시된 유통기한까지 안정합니다.

온라인 정보



국문

추가적인 정보를 위해 제품 페이지를 방문하세요

주문 정보

제품	Cat. No.
AccuPower® SHIVD 1 st PCR Kit, 0.2 ml thin-wall 8-strip tubes with attached cap / 96 tubes	K-2921
AccuPower® SHIVD 2 nd PCR Kit, 0.2 ml thin-wall 8-strip tubes with attached cap / 96 tubes	


고지

제품, 서비스, 사양, 설명 등 제공된 모든 정보는 사전 예고 없이 절차에 따라 변경될 수 있습니다.

기호 설명

Batch Code	Biological Risks	Catalog Number	Caution
Consult Instructions For Use	Contains Sufficient for <n> tests	Do not Re-use	Manufacturer
Research Use Only	Temperature Limitation	Use-by Date	

실험방법

단계		세부 절차																								
1	 1st PCR: 반응용액 조성	1. 주형 DNA 와 3 차 증류수를 준비한 후, <i>AccuPower® SHIVD 1st PCR Kit</i> 에 주형 DNA 를 넣습니다. 2. 최종 반응용액의 부피가 20 µl 되도록 3 차 증류수를 넣습니다. (PCR 튜브에 건조된 premix 의 부피는 포함하지 않습니다.) 3. 반응용액을 vortex 하여 premix 를 완전히 녹인 후, spin down 합니다.																								
2	 1st PCR: PCR 반응	4. PCR 튜브를 Thermal cyler 에 장착 후, 다음과 같이 PCR 조건을 설정합니다. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>과정</th> <th>온도</th> <th>시간</th> <th>반복수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pre-denaturation</td> <td>95°C</td> <td>3 분</td> <td>1 cycle</td> </tr> <tr> <td>Denaturation</td> <td>95°C</td> <td>30 초</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Annealing</td> <td>59°C</td> <td>30 초</td> <td>35 cycles</td> </tr> <tr> <td>Extension</td> <td>72°C</td> <td>30 초</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Final extension</td> <td>72°C</td> <td>2 분</td> <td>1 cycle</td> </tr> </tbody> </table> * Note: 상기 조건은 Thermal cyler 에 따라 변경이 가능합니다.	과정	온도	시간	반복수	Pre-denaturation	95°C	3 분	1 cycle	Denaturation	95°C	30 초		Annealing	59°C	30 초	35 cycles	Extension	72°C	30 초		Final extension	72°C	2 분	1 cycle
과정	온도	시간	반복수																							
Pre-denaturation	95°C	3 분	1 cycle																							
Denaturation	95°C	30 초																								
Annealing	59°C	30 초	35 cycles																							
Extension	72°C	30 초																								
Final extension	72°C	2 분	1 cycle																							
3	 2nd PCR: 반응용액 조성	5. 1st PCR 반응이 종료된 후, 반응용액 1~5 ul 를 <i>AccuPower® SHIVD 2nd PCR Kit</i> 에 넣습니다. 6. 최종 반응용액의 부피가 20 µl 되도록 3 차 증류수를 넣습니다. (PCR 튜브에 건조된 premix 의 부피는 포함하지 않습니다.) 7. 반응용액을 vortex 하여 premix 를 완전히 녹인 후, spin down 합니다.																								
4	 2nd PCR: PCR 반응	8. PCR 튜브를 Thermal cyler 에 장착 후, 다음과 같이 PCR 조건을 설정합니다. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>과정</th> <th>온도</th> <th>시간</th> <th>반복수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pre-denaturation</td> <td>95°C</td> <td>3 분</td> <td>1 cycle</td> </tr> <tr> <td>Denaturation</td> <td>95°C</td> <td>30 초</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Annealing</td> <td>59°C</td> <td>30 초</td> <td>35 cycles</td> </tr> <tr> <td>Extension</td> <td>72°C</td> <td>20 초</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Final extension</td> <td>72°C</td> <td>2 분</td> <td>1 cycle</td> </tr> </tbody> </table> * Note: 상기 조건은 Thermal cyler 에 따라 변경이 가능합니다.	과정	온도	시간	반복수	Pre-denaturation	95°C	3 분	1 cycle	Denaturation	95°C	30 초		Annealing	59°C	30 초	35 cycles	Extension	72°C	20 초		Final extension	72°C	2 분	1 cycle
과정	온도	시간	반복수																							
Pre-denaturation	95°C	3 분	1 cycle																							
Denaturation	95°C	30 초																								
Annealing	59°C	30 초	35 cycles																							
Extension	72°C	20 초																								
Final extension	72°C	2 분	1 cycle																							
5	 결과 분석	9. PCR 반응이 종료된 후, 반응용액은 4~8°C 로 유지합니다. 10. 반응용액은 loading dye 첨가 없이, 전기영동을 통해 결과를 분석합니다.																								